



複数の部位が混濁した白内障は混合型と呼び、それ

ぞの症状が重なってみら

れます。年齢と共に有病率

が増えて自覚症状は強く、

頻度も多くなります。

「白内障の病型と見え方、
付き合い方」

今回は中高年者を悩ます
代表的な眼科疾患の白内障

について述べてみます。

白内障の原因となる水晶

体の混濁は、概ね40歳にな

ると始まると考えられます。

水晶体は中心に水晶体核、

その周りを包む皮質、さら

に全体を包む水晶体囊から

見え方や訴えには個人差
がありますが、核白内障は
色彩感覚とコントラストの
低下や近視化、皮質白内障
では眩しさやかすみ、囊下
白内障は視力の低下を感じ
ることが多いようです。

白内障の部位別分類

〈核白内障〉



光

濁った水晶体

〈皮質白内障〉



〈囊下白内障〉



※新年の診療は5日から。
(院長 伊田 宣史)
新規の診療は5日から。
拡大し、元には戻りません。
最終的には、どの白内障も
手術が必要になります。

透明度の高い水晶体は、
非常にデリケートな組織で、
一度混濁を生じると徐々に
手術を行った方が賢明です。
手術を行った方が賢明です。

白内障では、どの部位が濁っても
成り、どの部位が濁っても
代表的な眼科疾患の白内障

白内障です。部位別に、核
白内障、皮質白内障、囊下
白内障と分類します(図)。

皮質白内障は一般に進行
が緩やかで、点眼薬で経過
を見ることが出来ます。ま
たルテインやビタミンCの
大量摂取は核白内障の進行
を遅らせるとの報告があり
ます。しかし、近視が進行
する核白内障や65歳以上の
囊下白内障は進行が早く、
すぐ視力に影響が出るので
手術を行った方が賢明です。

- ・眼科一般
- ・日帰り手術
- ・コンタクトレンズ取り扱い



伊田眼科クリニック

診療時間	月	火	水	木	金	土	日・祝
9:30	○	○	○	○	○	○	
12:30							
15:30	○	手術	○				
18:30							

【休診日】木・土曜午後
日曜、祝日

TEL 079-556-8600

三田市武庫が丘7-7-4 エムズIIビル1階 <http://www.ida-ganka.com>

